

Корь – острое вирусное инфекционное заболевание.

Источник инфекции

Больной человек, который заразен за **6 и менее** дней до появления на нем сыпи, а также в первые **4 дня** после появления сыпи. Вирус передается воздушно-капельным путем при кашле, чихании и разговоре.

Инкубационный (скрытый) период кори

В среднем составляет **7-14 дней**, после чего появляются первые признаки заболевания.

Симптомы кори:

Первые признаки:



общее недомогание,
утомляемость



повышение температуры тела



головные боли,
светобоязнь



насморк,
боль в горле



покраснение глаз,
слезоточивость (конъюнктивит)



кашель

Основные признаки:



Сыпь по всему телу, распространяющаяся
начиная с головы, после опускающаяся
донижней части тела и ног;



белые (как скопление манной крупы)
и красные пятна в ротоглотке

Осложнения кори:

- ✓ **пневмония, бронхит, синусит.**
 - ✓ **энцефалит (воспаление оболочек мозга).**
 - ✓ **при позднем обращении и наличии тяжелых сопутствующих заболеваний могут развиться кома и летальный исход.**
- Эффективного и специфического метода лечения кори нет. Лечение симптоматическое.

Профилактика кори:

Единственной эффективной защитой от кори является **вакцинация**.

В Казахстане вакцинация против кори проводится дважды: первая в возрасте **1 год** и вторая в возрасте **6 лет**. Для вакцинации используется безопасная и эффективная вакцина против кори в комбинации с краснушным и паротитным компонентом.

Необходимо помнить, что болезнь всегда легче предупредить, чем лечить!

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ КОРЬЮ В КАЗАХСТАНЕ

Корь - острое инфекционное заболевание, которое наиболее распространено среди детей



Заболевание может протекать с серьезными осложнениями вплоть до летального исхода



Источник инфекции при кори - больной человек, вирус передается воздушно-капельным путем и отличается крайне высокой заразностью

СИМПТОМЫ КОРИ У ДЕТЕЙ:

ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА

СЫПЬ

БОЛЬ В ГОРЛЕ

КАШЕЛЬ

ВЫРАЖЕННАЯ ИНТОКСИКАЦИЯ ОРГАНИЗМА

Благодаря вакцинации уровень заболеваемости корью за последние 20 лет снизился более чем в 900 раз (с 1935 случаев в 1998 году до 4 случаев в 2018 году)

В КАЗАХСТАНЕ ВАКЦИНАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРОТИВ КОРИ ПРОВОДИТСЯ ДВА РАЗА:



в возрасте от 12 до 15 месяцев



в возрасте 6-7 лет

По данным ВОЗ, в текущем году неблагополучными по кори являются ряд стран Европы:

УКРАИНА (ПОЧТИ 30 ТЫСЯЧ ЗАБОЛЕВШИХ, ИЗ НИХ 13 УМЕРЛО)

СЕРБИЯ (БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ, ИЗ НИХ 14 УМЕРЛО)

ГРЕЦИЯ (БОЛЕЕ 1 100 СЛУЧАЕВ)

ВОЗ считает, что основными причинами вспышки кори в развитых странах является снижение охвата вакцинацией населения